

# uniumax<sup>®</sup>

BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO RADICALE  
E VEGETATIVO



Alta concentrazione di acidi umici e fulvici

SPECIALITÀ NUTRIZIONALE



MIGLIORA LA CRESCITA DELLE RADICI E OTTIMIZZA L'ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

PROMUOVE L'ATTECCHIMENTO DELLE PIANTINE DOPO IL TRAPIANTO

FAVORISCE IL "RINVERDIMENTO" DELLE FOGLIE E UN RAPIDO RECUPERO  
DALLO STRESS AMBIENTALE

MASSIMIZZA L'EFFICACIA DEGLI AGROFARMACI E DEI FERTILIZZANTI

Sospensione concentrata di leonardite pura micronizzata



unifluid<sup>®</sup>  
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

  
UNIMER  
1 9 6 9



PESO NETTO  
**6,1 kg** (5 L)

PESO NETTO  
**1,22 kg** (1 L)

#### COMPOSIZIONE

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Sostanza organica (SO) tal quale                  | 33%  |
| Sostanza organica (SO) sulla sostanza secca       | 82%  |
| SO umificata come % della SO sulla sostanza secca | 92%  |
| Acidi umici                                       | 30%  |
| Acidi fulvici                                     | 10%  |
| Azoto organico (N) sulla sostanza secca           | 0,9% |
| Rapporto C/N                                      | 45,5 |

#### PARAMETRI FISICO-CHIMICI

pH (1%): 4,5 ± 0,5  
CE (1%): 0,3 mS/cm ± 0,05  
Densità (g/ml): 1,22  
Aspetto: liquido viscoso nero

#### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta restrizioni per la miscela con altri formulati. Si consiglia comunque un test preliminare su piccola scala.

Conservare a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C nella confezione originale, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta alla luce solare. **Si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

- promuovere la crescita delle radici
- superare la crisi post-trapianto
- aumentare l'assorbimento dei nutrienti
- ridurre lo stress (salinità, siccità, squilibrio idrico)

**APPLICAZIONE  
RADICALE**

#### CARATTERISTICHE

Specialità nutrizionale a base di **leonardite pura micronizzata** in sospensione altamente concentrata. L'innovativo processo tecnologico rende la formulazione particolarmente stabile, aumentando notevolmente la biodisponibilità delle sostanze attive in essa contenute (acidi umici, fulvici, humine).

Inoltre, il **pH sub-acido** rappresenta un'ulteriore caratteristica distintiva che consente un utilizzo più sicuro e più ampio in combinazione con altri formulati, oltre a una maggiore efficienza agronomica tramite applicazione fogliare o radicale.

UNIUMAX consente di:

- promuovere la crescita radicale e migliorare l'assorbimento dei nutrienti;
- superare la crisi post-trapianto favorendo l'attecchimento delle piantine;
- favorire la fotosintesi e il "rinverdimento" delle foglie riducendo lo stress ambientale (siccità, salinità, trattamenti agrofarmaci, ecc.).

È miscibile con tutti gli agrofarmaci, fertilizzanti e correttivi di uso comune (es. ferro chelato), massimizzandone l'efficacia grazie al suo **pH ottimale e all'eccellente compatibilità in miscela.**

#### DOSAGGI PER CULTURA

| CULTURA                                                        | PERIODO                                                                                        | DOSE               |                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                |                                                                                                | FOGLIARE*          | FERTIRRIGAZIONE                  |
| <b>Alberi da frutto, agrumi, olivo, vite, actinidia (kiwi)</b> | Dalla ripresa vegetativa, applicazioni ogni 10-14 giorni                                       | 150 – 300 ml/100 L | 3 – 6 L/ha                       |
| <b>Ortaggi</b>                                                 | Dopo il trapianto oppure dalla comparsa delle prime foglie vere, applicazioni ogni 7-10 giorni | 150 – 300 ml/100 L | 3 – 6 L/ha                       |
| <b>Culture in serra</b>                                        |                                                                                                | 150 – 300 ml/100 L | 300 – 600 ml/1000 m <sup>2</sup> |
| <b>Cereali, colture industriali</b>                            | Post-emergenza, in combinazione con agrofarmaci                                                | 1,5 – 2 L/ha       | /                                |
| <b>Fiori, colture ornamentali</b>                              | Dopo rinvaso o trapianto, applicazioni ogni 7-10 giorni                                        | 150 – 300 ml/100 L | 300 – 600 ml/1000 m <sup>2</sup> |

\*Si consiglia di utilizzare un volume d'acqua per ettaro sufficiente a bagnare uniformemente la chioma fino al punto di gocciolamento.

#### BAGNO RADICALE

Soluzione all'1,5-2%, immergere le radici per alcuni minuti prima del trapianto.



**APPLICAZIONE  
FOGLIARE**

- promuovere la fotosintesi
- favorire il "rinverdimento" delle foglie
- ridurre lo stress (erbicidi, alte/basse temperature)
- stimolare la crescita vegetativa