unisize®

BIOPROMOTORE DELLA PEZZATURA
E QUALITÀ DEI FRUTTI

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Con acidi carbossilici, amminoacidi e peptidi vegetali

SPECIALITÀ NUTRIZIONALE



FAVORISCE UNA PEZZATURA DEI FRUTTI OTTIMALE E UNIFORME

RIDUCE LA CASCOLA PRECOCE DEI FRUTTI, MIGLIORANDO LA TOLLERANZA ALLO STRESS

SUPPORTA UNO SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA PIANTA, PER RESE MIGLIORI E PIÙ UNIFORMI

FAVORISCE UNA MIGLIORE QUALITÀ, COLORE E SAPORE DEI FRUTTI

Azione rapida per un assorbimento rapido e completo mediante applicazione fogliare o radicale

unifluid®
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

UNIMER 1969



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PESO NETTO
6,6 kg (5 L)

PESO NETTO
1,32 kg (1 L)

COMPOSIZIONE

Amminoacidi totali	5,1%
Amminoacidi liberi	5,0%
Grado di idrolisi	98%

PARAMETRI FISICO-CHIMICI

pH (1%): 6,0 ±0,5
Densità (g/ml): 1,32
Aspetto: liquido arancione

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta restrizioni per la miscela con altri formulati, ad eccezione dei prodotti a base di zolfo e oli minerali. È comunque generalmente consigliabile effettuare un test su piccola scala.
Conservare a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C nella confezione originale, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta alla luce solare. **Si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CARATTERISTICHE

UNISIZE è un BIOSTIMOLANTE a base di amminoacidi e peptidi di origine vegetale ottenuti tramite idrolisi enzimatica, con acidi carbossilici organici a basso peso molecolare.

Applicato dopo la caduta dei petali, il prodotto stimola la biosintesi dei regolatori naturali della crescita, promuovendo la divisione cellulare nei frutti in sviluppo e aiutandoli a raggiungere una pezzatura ottimale e uniforme.

Gli acidi carbossilici agiscono sinergicamente con gli L-amminoacidi e i peptidi per migliorare la tolleranza agli stress ambientali quali alte temperature, siccità e salinità, preservando al contempo il metabolismo primario durante lo sviluppo dei frutti.

Le applicazioni tardive, dalla fase di accrescimento dei frutti fino alla maturazione, favoriscono l'accumulo di carboidrati, proteine e ormoni naturali della maturazione, migliorando così la qualità dei frutti, il colore, il contenuto di sostanza secca e il sapore.

Il pH ottimale (sub-acido), insieme all'azione chelante degli acidi carbossilici, favorisce un assorbimento rapido e completo di tutti i nutrienti sia per via fogliare che radicale.

DOSAGGI PER COLTURA

UNISIZE può essere utilizzato su qualsiasi tipo di coltura, tramite applicazione fogliare o sistema di irrigazione.
Applicazione sicura su qualsiasi coltura e in qualsiasi stadio fenologico.

APPLICAZIONE FOGLIARE

COLTURA	PERIODO	DOSE*
Alberi da frutto, vite, agrumi, olivo	Dall'allegagione alla maturazione, 2–3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	2 – 3 L/ha
Uva da tavola, actinidia (kiwi)	Dall'allegagione alla maturazione, 3-4 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	2 – 3 L/ha
Ortaggi e colture estensive	Da metà ciclo colturale (ortaggi a foglia) o dall'allegagione (ortaggi da frutto) fino alla maturazione, 2-3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	2 – 3 L/ha
Colture in serra (pomodoro, peperone, cucurbitacee, ecc.)	Dalla prima allegagione alla maturazione, 2-3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	200 – 300 ml/100 L

*Si consiglia di utilizzare un volume d'acqua per ettaro sufficiente a bagnare uniformemente la chioma fino al punto di gocciolamento.

FERTIRRIGAZIONE

Il prodotto può essere utilizzato anche in fertirrigazione alla dose di 5 – 10 L/ha per ogni applicazione.
Ripetere 2-3 volte a intervalli di 7-10 giorni.

Scopri di più

unifluid®
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

Unimer S.p.A.
Via Paleocapa, 7
20121 Milano (MI)
unimerfertilizzanti.it