uniumax®

BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO RADICALE
E VEGETATIVO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Alta concentrazione di acidi umici e fulvici

SPECIALITÀ NUTRIZIONALE



MIGLIORA LA CRESCITA DELLE RADICI E OTTIMIZZA L'ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

PROMUOVE L'ATTECCHIMENTO DELLE PIANTINE DOPO IL TRAPIANTO

FAVORISCE IL "RINVERDIMENTO" DELLE FOGLIE E UN RAPIDO RECUPERO DALLO STRESS AMBIENTALE

MASSIMIZZA L'EFFICACIA DEGLI AGROFARMACI E DEI FERTILIZZANTI

Sospensione concentrata di leonardite pura micronizzata

unifluid®
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

UNIMER 1969

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



PESO NETTO
6,1 kg (5 L)

PESO NETTO
1,22 kg (1 L)

COMPOSIZIONE

Sostanza organica (SO) tal quale	33%
Sostanza organica (SO) sulla sostanza secca	82%
SO umificata come % della SO sulla sostanza secca	92%
Acidi umici	30%
Acidi fulvici	10%
Azoto organico (N) sulla sostanza secca	0,9%
Rapporto C/N	45,5

PARAMETRI FISICO-CHIMICI

pH (1%): 4,5 ±0,5
CE (1%): 0,3 mS/cm ±0,05
Densità (g/ml): 1,22
Aspetto: liquido viscoso nero

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta restrizioni per la miscela con altri formulati. Si consiglia comunque un test preliminare su piccola scala.
Conservare a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C nella confezione originale, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta alla luce solare. **Si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CARATTERISTICHE

Specialità nutrizionale a base di **leonardite pura micronizzata** in sospensione altamente concentrata. L'innovativo processo tecnologico rende la formulazione particolarmente stabile, aumentando notevolmente la biodisponibilità delle sostanze attive in essa contenute (acidi umici, fulvici, humine).
Inoltre, il **pH sub-acido** rappresenta un'ulteriore caratteristica distintiva che consente un utilizzo più sicuro e più ampio in combinazione con altri formulati, oltre a una maggiore efficienza agronomica tramite applicazione fogliare o radicale.

UNIUMAX consente di:

- promuovere la crescita radicale e migliorare l'assorbimento dei nutrienti;
- superare la crisi post-trapianto favorendo l'attecchimento delle piantine;
- favorire la fotosintesi e il "rinverdimento" delle foglie riducendo lo stress ambientale (siccità, salinità, trattamenti agrofarmaci, ecc.).

È miscibile con tutti gli agrofarmaci, fertilizzanti e correttivi di uso comune (es. ferro chelato), massimizzandone l'efficacia grazie al suo **pH ottimale e all'eccellente compatibilità in miscela**.

DOSAGGI PER COLTURA

COLTURA	PERIODO	DOSE	
		FOGLIARE*	FERTIRRIGAZIONE
Alberi da frutto, agrumi, olivo, vite, actinidia (kiwi)	Dalla ripresa vegetativa, applicazioni ogni 10-14 giorni	150 – 300 ml/100 L	3 – 6 L/ha
Ortaggi	Dopo il trapianto oppure dalla comparsa delle prime foglie vere, applicazioni ogni 7-10 giorni	150 – 300 ml/100 L	3 – 6 L/ha
Colture in serra		150 – 300 ml/100 L	300 – 600 ml/1000 m²
Cereali, colture industriali	Post-emergenza, in combinazione con agrofarmaci	1,5 – 2 L/ha	/
Fiori, colture ornamentali	Dopo rinvaso o trapianto, applicazioni ogni 7-10 giorni	150 – 300 ml/100 L	300 – 600 ml/1000 m²

*Si consiglia di utilizzare un volume d'acqua per ettaro sufficiente a bagnare uniformemente la chioma fino al punto di gocciolamento.

BAGNO RADICALE

Soluzione all'1,5-2%, immergere le radici per alcuni minuti prima del trapianto.



APPLICAZIONE RADICALE

- promuovere la crescita delle radici
- superare la crisi post-trapianto
- aumentare l'assorbimento dei nutrienti
- ridurre lo stress (salinità, siccità, squilibrio idrico)

APPLICAZIONE FOGLIARE

- promuovere la fotosintesi
- favorire il "rinverdimento" delle foglie
- ridurre lo stress (erbicidi, alte/basse temperature)
- stimolare la crescita vegetativa

Scopri di più

unifluid®
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

Unimer S.p.A.
Via Paleocapa, 7
20121 Milano (MI)
unimerfertilizzanti.it

UNIMER 1969